

BACTIFOS



BEHANDELING VAN MENGMEEST

Korstvorming bij mest is een zeer actueel probleem, te wijten aan een samenloop van omstandigheden. Bactifos is een kant-en-klaar vloeibaar product bestemd voor een biologische aanpak van mestkorsten op basis van bacteriën, enzymen en micronutriënten.

PROBLEMEN MET DRIJFMEST ?

Korstvorming bij mest is een zeer actueel probleem, te wijten aan een samenloop van omstandigheden:

- ☑ **Methaanproductie:** methaanproductie (CH₄) zorgt voor veel gasbellen. Daardoor gaan o.a. kafdeeltjes mee naar boven en drogen uit.
- ☑ **Wegens mestdecreet:**
 - Minder volume mest doordat minder water gebruikt wordt
 - Minder frequent uitrijden van de mest, zodat de CH₄-bacteriën meer tijd hebben om zich te ontwikkelen
- ☑ **Uitdroging** door te lage relatieve vochtigheid, teveel tocht in de stal, ventilatie van onder de rooster
- ☑ **Grondstoffen** zoals gerst: vormt een goede C-bron voor de CH₄-bacteriën, bevat bovendien veel kafdeeltjes.

BIJKOMENDE PROBLEMEN

- Overlast van larven en vliegen
- Problemen bij het leegpompen
- Achterblijvend bezinksel in de mestput
- Schuimvorming
- Stankoverlast en schadelijke gassen, waaronder ammoniak



BACTIFOS, DE OPLOSSING

BACTIFOS is een kant-en-klaar vloeibaar product bestemd voor een biologische aanpak van mestkorsten op basis van bacteriën, enzymen en micronutriënten.

Effecten:

- Vloeibaar en homogeen maken van de mengmest in de putten
- Vernietiging van de korsten en van de aanslag
- Belangrijke vermindering van de ammoniakontwikkeling in de stallen.
- Geen verbranding van de gewassen bij het uitstrooien van de mengmest
- Aanzienlijke vermindering van geurhinder in de stallen wat soms de oorzaak kan zijn van geïrriteerde luchtwegen



BACTIFOS DOSERING

DOSERING IN LITER PER:

100 ZEUGEN / 100 VARKENS / 50 KALVEREN / 25 KOEIEN

GEBRUIK	1E DOSERING	MAANDELIJKE VERVOLGDOSERING
Preventief	1 liter	4-0.5 liter
Curatief	2 liter	1 liter (gedurende 3-4 maanden)



BACTIFOS DOSERING

BACTIFOS moet worden toegediend in de mengmestkelder.

Praktisch gebruik:

- Fles goed schudden voor gebruik
- Giet verdund product (zie hieronder) door roosters in de mestkelder. Doe dit op een tweetal plaatsen per hok (ver genoeg van zuigplaats).
- Bij erge korstvorming: meng de mest en zuig kelder eerst zo veel mogelijk leeg vooraleer product toe te dienen.
- Herhaal maandelijks.

Om de werking van het bacteriecomplex te activeren en een goede verdeling te garanderen is het aan te raden:



STAP 1

Bactifos oplossen
in warm water
(max 30°C)



STAP 2

een handvol voeder toevoegen
(om eventuele producten die
gebruikt worden om het water te
behandelen te neutraliseren)



STAP 3

Bactifos
oplossen



STAP 4

Enkel uren laten staan
bij 20°C vooraleer
in de mengmest te brengen





**FARMING
FORWARD**

www.agrologic.be

Agro Logic
Menensesteenweg 305A
8940 Wervik
T: 056 23 67 40
info@agrologic.be

WWW.AGROLOGIC.BE