




Racumin[®]

FOAM 

Efficiënte knaagdierbestrijding



Voordelen

- // Toegelaten tegen ratten en muizen.
- // Betrouwbaar: wordt opgenomen bij reiniging van de vacht.
- // Lange werking: schuimformulering gedurende 12 dagen.



Waar gebruikt u Racumin[®] Foam?

// In afgesloten ruimten:
landbouwgebouwen, woonwijken,
winkels, voedselabrieken, openbare
gelegenheden, stedelijke en industriële
bebouwing

// Looppaden, doorgangen

// Toegangspunten / hopen



// Verlaagde plafonds

// Doorgangen in de muur: waterleidingen,
elektrische kabels

// In vertrekken met een hoge
luchtvochtigheid (waar gebruiksklaar
lokaas kort stabiel blijft)

// In locaties waar voldoende alternatieve
voedselbronnen zijn waardoor de opname
van lokazen zeer laag is geweest

// Spouwmuuren



// Als er sprake is van neofobie
(angst voor nieuw voedsel)

// Kabelbuizen

// Plaatsen waar traditionele lokazen niet
gebruikt kunnen worden



Hoe gebruikt u Racumin[®] Foam

1. Voor de beste resultaten gebruikt u **Racumin[®] Foam** bij kamertemperatuur.
2. Schud de spuitbus zeer goed totdat de schudkogel duidelijk hoorbaar wordt.



3. Verwijder de veiligheidsdop en bewaar deze op een veilige plaats.
4. Bevestig de spuitspriet.
5. Niet aanbrengen op oppervlakken waar vlekken kunnen ontstaan; doe zo nodig



eerst een vlektest en veeg overmatig schuim weg met een droog papieren handdoekje.

6. Druk op de knop om het schuim op te spuiten.



7. Breng het schuim aan in bekende looppaden, doorgangen, holingangen en gaten in muren.
8. Zorg dat de knaagdieren de holingang nog kunnen gebruiken door deze duidelijk zichtbaar te houden en niet volledig met het schuim af te sluiten.



Racumin[®] Foam wordt voor een holingang aangebracht.

9. Creëer op looppaden met het schuim een obstakel waar het knaagdier overheen moet. Dat zorgt ervoor dat er wat schuim aan de onderkant van zijn lijf blijft zitten. Het obstakel moet niet te hoog zijn, het knaagdier moet er overheen kunnen kijken; anders zal het zich omdraaien en een andere route nemen.



Ontoegankelijk gat in de muur.

10. Houd minimaal een afstand van 2 meter aan van opslagplaatsen voor voedsel, diervoeder en oppervlakken waar voedsel wordt bereid.
11. Breng alleen aan op plaatsen die ontoegankelijk zijn voor kinderen en dieren.
12. Als u het product boven uw hoofd aanbrengt, zorg er dan voor dat u de spuitbus rechtop houdt.
13. Doe de veiligheidsdop er terug op als u klaar bent met het aanbrengen van **Racumin® Foam**.
14. Het aangebrachte schuim blijft meestal 7-12 dagen stabiel, afhankelijk van aanraking en temperatuur/vochtigheid.
15. **Racumin® Foam** wordt door het knaagdier opgegeten als het zichzelf verzorgt.
16. Gebruik samen met een traditioneel lokaas voor de beste resultaten.

Te gebruiken hoeveelheden

Dosering	
Voor de bestrijding van ratten	20g - 30g schuim/holingang of doorgang (grootte van een halve baksteen)
Voor de bestrijding van muizen	4g - 30g schuim/holingang of doorgang (grootte van een tennisbal)

Deze hoeveelheid kan worden aangebracht in één applicatie of een aantal kleinere applicaties langs het looppad.

Bij de start van de behandeling moeten de behandelde plaatsen, indien mogelijk, om de 2-3 dagen gecontroleerd worden. Zeker na dag 5 is een controle noodzakelijk. Nadien dienen de controles wekelijks te worden uitgevoerd.

Enkele van uw vragen beantwoord

1. Hoeveel applicaties zitten er in 1 spuitbus?

Het schuimvolume in 1 spuitbus is 12 liter (500 gram). Dat moet voldoende zijn voor ongeveer 125 applicaties voor muizen en 25 applicaties voor ratten per spuitbus.

2. Wat is het verschil tussen dit product en een contactgel?

Schuim is lichter en kan boven uw hoofd worden aangebracht. Omdat schuim bij applicatie uitzet, hoeft het niet met een pistool aangebracht te worden.

3. Wat is het werkzame bestanddeel van het product?

Racumin® Foam is de eerste generatie van een anticoagulerend middel met het werkzame bestanddeel coumatetralyl.

4. Is het product voor gebruik binnenshuis en buitenshuis?

Het product is alleen goedgekeurd voor gebruik binnenshuis.

5. Is het product alleen bestemd voor professioneel gebruik?

Racumin® Foam is alleen goedgekeurd voor professioneel gebruik.

6. Kan het product plekken of vlekken achterlaten?

Het product kan op bepaalde oppervlakken mogelijk blauwe plekken achterlaten en mag niet op gevoelige oppervlakken worden toegepast. Aanbevolen wordt eerst een vlektest te doen op een onopvallende plaats. Overmatig schuim moet worden weggeveegd met droge wegwerpdoekjes die volgens de lokale vereisten kunnen worden afgevoerd.

7. Mag het product ergens niet worden aangebracht?

// Buitenshuis - het product dient alleen binnenshuis te worden gebruikt

// Plaatsen waar vlekken een probleem kunnen zijn

// Schakelkasten, onbeschermd kabels en overal waar u geen water zou aanbrengen

// Op minder dan 2 meter afstand van voedsel en diervoeder

// Plaatsen die toegankelijk zijn voor kinderen en dieren

8. Is het product brandbaar?

Omdat het product een aerosol is, is het net als andere aerosols zeer brandbaar en het moet

op dezelfde manier worden behandeld. Bij aanbrengen mag NIET WORDEN GEROOKT en het product mag niet in open vuur worden gespoten.

9. Kan het product met lokazen worden gemengd?

Nee. **Racumin® Foam** moet worden gebruikt als aanvulling op uw regulier rodenticide lokaas.

10. Hoelang duurt het voordat de letale werking intreedt?

Net als met alle andere anticoagulerende middelen treedt de letale werking 4-6 dagen na consumptie op.

11. Blijft het product na aanbrengen zacht of droogt het uit?

Racumin® Foam is een unieke schuimformulering die tot 12 dagen na applicatie zacht blijft. Daarna breekt het af tot een poederachtige consistentie. In een warme of vochtige omgeving droogt het schuim sneller uit.

12. Als het aerosol nog niet is opgebruikt, hoelang blijft de resterende inhoud dan effectief en bruikbaar?

De houdbaarheid van het product is 2 jaar. Zelfs indien een gedeelte van het product al gebruikt is, blijft de houdbaarheid onveranderd. Zorg er vóór een nieuwe applicatie voor dat het product op kamertemperatuur is en schud de spuitbus dan zeer goed tot de schudkogel duidelijk hoorbaar wordt. **Racumin® Foam** is dan klaar voor gebruik.

13. Is Racumin® Foam waterbestendig?

Nee.

14. Bevat het Bitrex?

Ja.

15. Geven eventuele residuen risico op contaminatie?

Residuen geven altijd risico op contaminatie. Honden en katten moeten van de behandelde plaats worden weggehouden en eventuele residuen moeten worden opgeruimd met droge wegwerpdoekjes en dan worden afgevoerd volgens de lokale voorschriften.

16. Is het nodig om de spuitspriet schoon te maken?

Nee.

Effectieve en succesvolle bestrijding

Racumin® Foam is een innovatief rodenticide voor gebruik tegen ratten en muizen. De unieke schuimformulering zorgt er voor dat het product aan de vacht kleeft. Hierdoor wordt het door het knaagdier opgenomen wanneer het zijn vacht reinigt.

IPM-benadering

Racumin® Foam moet worden gebruikt als onderdeel van een IPM-benadering. Het moet samen met de normaliter gebruikte lokazen worden toegepast.

Racumin® Foam is de perfecte aanvulling op het assortiment van Rodilon® gamma.

Bij gebruik als onderdeel van een IPM-benadering samen met producten van het Rodilon® gamma, kan **Racumin® Foam** knaagdierinfestaties snel bestrijden.



Gebruik biociden veilig. Lees altijd het etiket en de productinformatie voor gebruik.

Racumin® Foam bevat 0,4% coumatetralyl. **Racumin®** is een geregistreerd handelsmerk van Bayer.

Toelatingsnummer: BE2014-0020.

Alle informatie in dit document werd correct geacht op het ogenblik dat het werd gedrukt. Gepubliceerd in 05.2019.



Bayer Cropscience SA-NV
J.E. Mommaertslaan 14
1831 Diegem (Machelen)

Stein De Meulemeester
0478/99 26 24
stein.demeulemeester@bayer.com

Voor meer informatie bezoek onze website
www.environmentalscience.bayer.be



Download MSDS en etiket informatie op
www.environmentalscience.bayer.be

